

***Aromia bungii* (Faldermann)**  
**Koksngrauzis**  
*Insecta: Coleoptera: Cerambycidae*

**Saimniekaugi**

Kauleņaugu (*Prunus* spp.) ģints koki: persiki (*P. persica*), aprikozes (*P. armeniaca*), plūmes (*P. domestica*), ķirši (*P. avium*); *Populus* spp. ģints koki.

**Ģeogrāfiskā izplatība**

*A. bungii* izcelsme ir no Āzijas valstīm, kur tas sastopams Korejā, Ķīnā, Mongolijā, Taivānā, Vjetnamā. Eiropā konstatēts Itālijā, Lielbritānijā un Vācijā (vistuvāk Latvijai).

**Simptomi**

Kāpuri veido 17-22 cm garas ejas koka stumbrā un lielākajos zaros. Vaboles izskrejas ovālas, 13 mm diametrā.

Uzbrūk veselīem vai nedaudz novājinātiem kokiem. Invadētajam kokam samazinās ražība, tas var iet bojā.

**Bioloģija un morfoloģija**

Koksngrauža dzīves cikls ilgst divus vai trīs gadus. Ziemā ejās koksnē kāpura stadijā. Vaboles izlido no jūnija beigām līdz augusta sākumam.

Kāpurs līdz 40 mm garš, gaišā krāsā, ar īsām krūšu kājām un īsiem matiņiem.

Vabole 22-38 mm gara, ķermenis melns, ar spīdīgi melniem segspārniem. Priekškrūtis sarkanas, ar diviem

sānu izaugumiem. Taustekļi melni, vismaz tikpat gari kā ķermeņi. Vabole var būt arī pilnīgi melna.

No Latvijā sastopamās sugas *Aromia moschata* atšķiras pēc krāsojuma.

**Izplatīšanās veidi**

Lokāli koksngrauzis pārlido nelielos attālumos.

Lielos attālumos koksngrauzis izplatās ar invadētu koksnī, iepakojamo un augu stādāmo materiālu (visās attīstības stadijās).

**Paraugu nonemšana**

*A. bungii* iespējams konstatēt, ievācot bojātas saimniekauga koksnes paraugus ar koksngrauzi visās tā attīstības stadijās.

**Pārbaudes laiks**

Paraugus, *A. bungii* konstatēšanai, ievāc saimniekaugu veģetācijas periodā.



*A. bungii* imago  
(Foto: Václav Hanzlík)



*A. bungii* izskrejas  
(Foto: Raffaele Griffo)



*A. bungii* kāpurs  
(Foto: Bruno Espinosa)



*A. bungii* bojāts koks  
(Foto: Bruno Espinosa)